

Τοποθέτηση προϊόντων θρέψης και βιοδιεγερτών σε σιτηρά




Στόχος

- ❖ Άμβλυση της καταπόνησης (κυρίως λόγω καιρικών συνθηκών)
- ❖ Προώθηση της ανάπτυξης

Πρόταση

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ❖ Multiple™ Pro | 100 cc/στρ. |
| + | |
| ❖ Seamac® Power | 40-50 gr/στρ |
| ή | |
| ❖ Seamaxx® | 200-250 ml/στρ. |



10

21


Στάδιο εφαρμογής
(BBCH 10 - 21)

Στόχος

- ❖ Περισσότερα και πιο υγιή αδέλφια

Πρόταση

- | | |
|---------------------|-----------------|
| ❖ Multiple™ Pro | 100 cc/στρ. |
| + | |
| ❖ Seamac® Power | 40-50 gr/στρ |
| ή | |
| ❖ Seamaxx® | 200-250 ml/στρ. |
| ή (μετά από δοκιμή) | |
| ❖ Seamac® Pro | 250 ml/στρ. |




Στάδιο εφαρμογής
(BBCH 21 - 30)

Στόχος

- ❖ Άμβλυνση προβλημάτων φυτοτοξικότητας από εφαρμογές ζιζανιοκτόνων
- ❖ Καλή ανάπτυξη των αδελφιών

Πρόταση

Multiple™ Pro	100 cc/στρ.
+	
❖ Seamac® Power	40-50 gr/στρ
ή	
❖ Seamaxx®	200-250 ml/στρ.
ή (μετά από δοκιμή)	
❖ Seamac® Pro	250 ml/στρ.




Στάδιο εφαρμογής
(BBCH 30 - 37)

Στόχος

- ❖ Διατήρηση της υγείας του φυτού
- ❖ Προετοιμασία του φυτού για είσοδο στο στάδιο της άνθησης

Πρόταση

Multiple™ Pro	100 cc/στρ.
+	
❖ Seamac® Power	40-50 gr/στρ
ή	
❖ Seamaxx®	200-250 ml/στρ.
ή (μετά από δοκιμή)	
❖ Seamac® Pro	250 ml/στρ.



Στάδιο εφαρμογής
(BBCH 37 - 61)

Στόχος

- ❖ Αύξηση βάρους και ποιότητας καρπών
- ❖ Αύξηση περιεκτικότητας πρωτεϊνών

Πρόταση

Multiple™ Pro

100 cc/στρ.

+

❖ **Seamac® Pro**


200-250 ml/στρ.



71 - 79

Στάδιο εφαρμογής
(BBCH 71 - 79)

Θρέψη



Αβιοτικό στρες

